

КАЛЕНДАР ЩЕПЛЕНЬ
ДЛЯ ДІТЕЙ ТА
ДОРΟΣЛИХ



<https://vaccine.org.ua/vakczynacziya-v-ukrayini/vaccinationua-calendar/>

ХОЧЕШ ДІЗНАТИСЯ
БІЛЬШЕ?

<https://vaccine.org.ua>



Гаряча лінія

Міністерство охорони
здоров'я України


0 800 505 201

0 800 60 20 19

Центр громадського
здоров'я України

+380 44 334 56 89

ЗАХИСТИ
СВОЄ
МАЙБУТНЄ
СЬОГОДНІ



ВАКЦИНАЦІЯ
ВІД ВІРУСУ
ПАПІЛОМИ
ЛЮДИНИ

ЧИ ЦЕ БЕЗПЕЧНО?

- **Двовалентна (Cervarix):**
Захищає від 2 типів ВПЛ (16 та 18).
Спрямована суто на профілактику раку шийки матки.
- **Чотиривалентна (Gardasil):**
Захищає від 4 типів ВПЛ (6, 11, 16 та 18).
Забезпечує захист як від раку шийки матки, так і від генітальних кондилом (бородавок).
- **Дев'ятивалентна (Gardasil 9):**
Захищає від 9 типів ВПЛ (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 та 58).
Надає найбільш повний захист, покриваючи додаткові високоризикові типи вірусу, які також можуть викликати рак.

Будь-яка з цих вакцин є ефективною для захисту від раку. Проконсультуйтеся зі своїм лікарем, щоб обрати найкращий варіант для вашої дитини, виходячи з наявності вакцини та ваших потреб.

ПРАВДА ПРОТИ МІФІВ

- **Міф 1:** «Це нова і неперевірена вакцина».
Факт: Перші вакцини проти ВПЛ були схвалені у 2006 році. З того часу введені сотні мільйонів доз у всьому світі, і безпека ретельно контролюється.
- **Міф 2:** «Вакцинація підштовхує підлітків до раннього статевого життя».
Факт: Численні дослідження довели, що вакцинація не впливає на вік початку статевих стосунків або сексуальну поведінку. Це просто медичний захист.
- **Міф 3:** «Вакцина викликає безпліддя».
Факт: Абсолютно немає жодних наукових доказів цього. Навпаки, вакцина захищає від раку шийки матки, лікування якого часто призводить до безпліддя.



**ЗАХИСТИ СВОЮ
ДИТИНУ.
ЇЇ МАЙБУТНЄ
ЗДОРОВ'Я
ПОЧИНАЄТЬСЯ З
ТВОЄЇ ТУРБОТИ.**



ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО ВАКЦИНАЦІЮ ВІД ВПЛ

ПРОФІЛАКТИКА РАКУ

Вакцина захищає від типів ВПЛ, які найчастіше викликають рак шийки матки (до 90% випадків), а також рак вульви, піхви та ануса.

ВІКОВА РЕКОМЕНДАЦІЯ:

Найкращий час для вакцинації – вік від 9 до 14 років. У цьому віці імунна система реагує на вакцину найсильніше.

ВАКЦИНАЦІЯ ДО КОНТАКТУ

Вакцина найбільш ефективна, якщо її введення відбулося ДО початку статевого життя, тобто до потенційного контакту з вірусом.

СХЕМА ВВЕДЕННЯ

У віці 9–14 років зазвичай достатньо всього двох доз з інтервалом 6–12 місяців (замість трьох доз для старших).

ЯК ОТРИМАТИ ЗАХИСТ?

- Крок 1: Зверніться до свого сімейного лікаря або педіатра.
- Крок 2: Обговоріть наявність вакцини та графік введення.
- Крок 3: Підпишіть згоду на вакцинацію.